



Departemen Matematika

Ujian Akhir Semester

Fungsi Kompleks II

WILDAN BAGUS WICAKSONO

Matematika 2022

wildan-wicaksono.github.io

2024

Soal

- 1] Gambarlah lintasan C suatu segitiga dari $z = 0$ ke $z = 1$ ke $z = i$ dan kembali ke $z = 0$. Selanjutnya, hitunglah $\int_C \operatorname{Re}(8\bar{z}^2 + 2i) dz$.

- 2] Hitunglah $\int_C f(z) dz$ jika

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)^2}$$

sepanjang lengkungan $C : |z - i| = 2$.

- 3] Tentukan jari-jari dan cakram konvergensi dari deret pangkat

$$\sum_{k=11}^{\infty} \frac{2^k z^{2k}}{k^2 + k}.$$

- 4] Tentukan bagian utama dan bagian reguler dari

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}$$

untuk $z \neq 0, 1, 2$.


- 5] Dengan menggunakan Teorema Residu, buktikan bahwa

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(t)}{t^2 + 1} dt = \frac{\pi}{e}.$$

Gambarlah lintasan C suatu segitiga dari $z = 0$ ke $z = 1$ ke $z = i$ dan kembali ke $z = 0$. Selanjutnya, hitunglah $\int_C \operatorname{Re}(8\bar{z}^2 + 2i) dz$.

Solusi:

Misalkan C_1 lintasan $z = 0$ ke $z = 1$, C_2 lintasan $z = 1$ ke $z = i$, dan C_3 lintasan $z = i$ ke $z = 0$. Maka $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$ sehingga $\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \int_{C_3} f(z) dz = \sum_{i=1}^3 \int_{C_i} f(z) dz$.



Perhatikan bahwa

$$\operatorname{Re}(8\bar{z}^2 + 2i) = \operatorname{Re}(9\bar{z}^2) + \operatorname{Re}(2i) = 8\operatorname{Re}(\bar{z}^2).$$

Misalkan $z = x + iy$ di mana $x, y \in \mathbb{R}$, maka

$$\bar{z}^2 = (x - iy)^2 = x^2 - y^2 - 2ixy \implies 8\operatorname{Re}(\bar{z}^2) = 8(x^2 - y^2)$$

Ini berarti

$$\int_C \operatorname{Re}(8\bar{z}^2 + 2i) dz = \int_C 8(x^2 - y^2) dz = 8 \int_C (x^2 - y^2) dz = 8 \sum_{i=1}^3 \int_{C_i} (x^2 - y^2) dz.$$

Pada lintasan C_1 , parameterisasi $z = t$ di mana $0 \leq t \leq 1$, diperoleh $(x, y) = (t, 0)$ dan $dz = dt$.

Ini berarti

$$\int_{C_1} (x^2 - y^2) dz = \int_0^1 t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_{t=0}^{t=1} = \frac{1}{3}.$$

Pada lintasan C_2 , parameterisasi $z - 1 = t(i - 1) \implies z = 1 + (i - 1)t = (1 - t) + it$ di mana $0 \leq t \leq 1$. Diperoleh $(x, y) = (1 - t, t)$ dan $dz = i dt$ sehingga

$$\int_{C_2} (x^2 - y^2) dz = \int_0^1 ((1 - t)^2 - t^2) \cdot i dt = i \int_0^1 (1 - 2t) dt = i [t - t^2]_{t=0}^{t=1} = 0.$$

Pada lintasan C_3 , parameterisasi $z = (1 - t)i$ di mana $0 \leq t \leq 1$. Maka $(x, y) = (0, 1 - t)$ dan $dz = -i dt$ sehingga

$$\int_{C_3} (x^2 - y^2) dz = \int_0^1 -(1 - t)^2(-i dt) = i \int_0^1 (1 - 2t + t^2) dt = i \left[t - t^2 + \frac{t^3}{3} \right]_{t=0}^{t=1} = \frac{i}{3}.$$

Jadi,

$$\int_C \operatorname{Re}(8\bar{z}^2 + 2i) dz = 8 \sum_{i=1}^3 \int_{C_i} (x^2 - y^2) dz = 8 \left(\frac{1}{3} + 0 + \frac{i}{3} \right) = \boxed{\frac{8 + 8i}{3}}.$$

Hitunglah $\int_C f(z) dz$ jika

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)^2}$$


sepanjang lengkungan $C : |z - i| = 2$.

Solusi:

Perhatikan bahwa

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)^2} = \frac{1}{(z + 2i)^2(z - 2i)^2}$$

memiliki titik singular $z = -2i$ dan $z = 2i$, terlebih lagi keduanya titik singular terisolasi (sehingga memiliki ekspansi deret Laurent di sekitar $z = -2i$ dan $z = 2i$). Menurut Teorema Residu, $\int_C f(z) dz = \pm 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), 2i)$ di mana $+$ saat C berorientasi positif, dan $-$ saat C berorientasi negatif.



Perhatikan bahwa $f(z) = \frac{1/(z + 2i)^2}{(z - 2i)^2} = \frac{\varphi(z)}{(z - 2i)^2}$ di mana $\varphi(z) = \frac{1}{(z + 2i)^2}$. Karena $\varphi(2i) \neq 0$ dan $\varphi(z)$ analitik di $z = 2i$, maka $z = 2i$ merupakan *pole* (titik kutub) dari $f(z)$ dengan order 2.

Akibatnya,

$$\operatorname{Res}(f(z), 2i) = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{d}{dz} (z-2i)^2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{d}{dz} \frac{1}{(z+2i)^2} = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{-2}{(z+2i)^3} = \frac{-2}{(4i)^3} = \frac{1}{32i}.$$

Jadi,

$$\int_C f(z) dz = \pm 2\pi \cdot \frac{1}{32i} = \boxed{\pm \frac{\pi}{16}},$$

di mana $+$ saat C berorientasi positif dan $-$ saat C berorientasi negatif.

Tentukan jari-jari dan cakram konvergensi dari deret pangkat

$$\sum_{k=11}^{\infty} \frac{2^k z^{2k}}{k^2 + k}.$$

Solusi:

Misalkan $a_k = \frac{2^k z^{2k}}{k(k+1)}$ dan $S = \sum_{k=11}^{\infty} a_k$, maka

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^{n+1} z^{2n+2}}{(n+1)(n+2)}}{\frac{2^n z^{2n}}{n(n+1)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 2z^2 \cdot \frac{n}{n+2} \right| = |2z^2| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 2|z|^2.$$

Jika $L < 1$, maka S konvergen mutlak, akibatnya S konvergen. Jika $L > 1$, maka S divergen. Jika $L = 1$, maka $|z| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ sehingga

$$\sum_{k=11}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=11}^{\infty} \left| \frac{(2z^2)^k}{k(k+1)} \right| = \sum_{k=11}^{\infty} \frac{|2z^2|^k}{k(k+1)} = \sum_{k=11}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=11}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

Hasil terakhir senilai dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{11}$ yang mana konvergen. Karena $\sum |a_k|$ konvergen, ini berarti $\sum a_k$ juga konvergen. Jadi, cakram konvergensinya adalah $\left\{ z : |z| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$

dan radius konvergensinya adalah $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Tentukan bagian utama dan bagian reguler dari

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}$$

untuk $z \neq 0, 1, 2$.

Komentar. Sepertinya soal tidak lengkap, harusnya diberikan pusat deret Laurent yang ditinjau. Di sini akan diberikan semua kemungkinan pusatnya. Terlebih lagi, dari masing-masing pusat memiliki kemungkinan ekspresi ekspansi deret Laurent yang berbeda-beda, tergantung daerah konvergensi yang diinginkan (di soal tidak ada juga).

Solusi:

Misalkan

$$\frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{p}{z} + \frac{q}{z-1} + \frac{r}{z-2}.$$

Ini berarti

$$1 = p(z-1)(z-2) + qz(z-2) + rz(z-1) = (p+q+r)z^2 - (3p+2q+r)z + 2p.$$

Ini berarti $p+q+r=0=3p+2q+r$ dan $1=2p$. Diperoleh $(p, q, r) = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$ yang berarti

$$\frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{1}{2(z-2)} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2z}.$$

Kasus 1. Akan ditinjau ekspansi di sekitar $z = t$ di mana $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$. Perhatikan bahwa

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z-c) + (c-2)} = \frac{1}{c-2} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{z-c}{c-2}\right)} = \frac{1}{c-2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-c}{c-2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(c-2)^{n+1}} (z-c)^n$$

dengan $0 < \left| -\frac{z-c}{c-2} \right| < 1 \iff 0 < |z-c| < |c-2|$. Lalu,

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-c) + (c-1)} = \frac{1}{c-1} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{z-c}{c-1}\right)} = \frac{1}{c-1} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-c}{c-1}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(c-1)^{n+1}} (z-c)^n$$

dengan $0 < \left| -\frac{z-c}{c-1} \right| < 1 \iff 0 < |z-c| < |c-1|$. Terakhir,

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-c)+c} = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{z-c}{c}\right)} = \frac{1}{c} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-c}{c}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{c^{n+1}}$$

dengan $0 < \left| -\frac{z-c}{c} \right| < 1 \iff 0 < |z-c| < |c|$. Jadi,

$$f(z) = \underbrace{0}_{\text{bag. utama}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{2(c-2)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(c-1)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2c^{n+1}} \right]}_{\text{bag. reguler}} (z-c)^n$$

dengan $0 < |z-c| < \min\{|c-2|, |c-1|, |c|\}$.

Kasus 2. Akan ditinjau ekspansi di sekitar $z = 0$. Karena $z = 0$ titik singular terisolasi, maka $f(z)$ memiliki ekspansi deret Laurent di sekitar $z = 0$. Tinjau

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{z^n}{2^{n+1}}, \quad 0 < |z| < 2.$$

Lalu,

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} -z^n, \quad 0 < |z| < 1.$$

Ini berarti

$$f(z) = \underbrace{\frac{1}{2z}}_{\text{bag. utama}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+2}}\right) z^n}_{\text{bag. reguler}}, \quad 0 < |z| < 1$$

Kasus 3. Akan ditinjau ekspansi di sekitar $z = 1$. Karena $z = 1$ titik singular terisolasi, maka $f(z)$ memiliki ekspansi deret Laurent di sekitar $z = 1$. Tinjau

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{(z-1)-1} = -\frac{1}{1-(z-1)} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} -(z-1)^n, \quad 0 < |z-1| < 1.$$

Lalu,

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1+(z-1)} = \frac{1}{1-[-(z-1)]} = \sum_{n=0}^{\infty} [-(z-1)]^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n, \quad 0 < |z-1| < 1.$$

Ini berarti

$$f(z) = \underbrace{-\frac{1}{z-1}}_{\text{bag. utama}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1 + (-1)^n}{2} (z-1)^n}_{\text{bag. reguler}}, \quad 0 < |z| < 1.$$

Kasus 4. Akan ditinjau ekspansi di sekitar $z = 2$. Karena $z = 1$ titik singular terisolasi, maka $f(z)$ memiliki ekspansi deret Laurent di sekitar $z = 2$. Tinjau

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{(z-2)+1} = \frac{1}{1-[-(z-2)]} = \sum_{n=0}^{\infty} [-(z-2)]^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n, \quad 0 < |z-2| < 1.$$

Lalu,

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z-2)+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \left[-\frac{z-2}{2}\right]} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-2}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-2)^n, \quad 0 < |z-2| < 2$$

Ini berarti

$$f(z) = \underbrace{\frac{1}{2(z-2)}}_{\text{bag. utama}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left(-(-1)^n + \frac{(-1)^n}{2^{n+2}}\right) (z-2)^n}_{\text{bag. reguler}}, \quad 0 < |z-2| < 1.$$

Dengan menggunakan Teorema Residu, buktikan bahwa

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(t)}{t^2 + 1} dt = \frac{\pi}{e}.$$

Cauchy Principal Value Theorem. Misalkan $f(x)$ fungsi bernilai real yang kontinu di $(-\infty, \infty)$ dan merupakan fungsi genap. Jika $PV \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ konvergen, maka $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ juga konvergen yang nilainya

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = PV \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx.$$

Solusi:


Tinjau $\frac{\cos(t)}{t^2 + 1}$ fungsi genap dan

$$PV \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(t)}{t^2 + 1} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{\cos(t)}{t^2 + 1} dt.$$

Pandang $\int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz$ di mana C_R adalah setengah lingkaran bagian atas yang berpusat di $z = 0$ dan berjari-jari R , berorientasi positif. Maka

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz$$

di mana γ_R adalah lintasan lengkung (busur) setengah lingkaran C_R tersebut.



Perhatikan bahwa $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} = \frac{e^{iz}}{(z+i)(z-i)}$ memiliki titik singular $z = i$ dan $z = -i$, terlebih lagi juga merupakan pole (titik kutub) dengan order 1 (masing-masing). Menurut Teorema Residu,

$$\int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z), i) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{iz}}{z + i} = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}.$$

Akan dibuktikan bahwa $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = 0$. Parameterisasi $z = Re^{ik}$ di mana $0 \leq k \leq \pi$, maka $dz = iRe^{ik} dk$ dan

$$\int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \int_0^\pi \frac{e^{iRe^{ik}} iRe^{ik}}{R^2 e^{2ik} + 1} dk = \int_0^\pi \frac{e^{iR \cos(k) - R \sin(k)} iRe^{ik}}{R^2 e^{2ik} + 1} dk = \int_0^\pi \frac{e^{iR \cos(k)} i e^{ik} \cdot Re^{-R \sin(k)}}{R^2 e^{2ik} + 1} dk.$$

Menggunakan sifat ketaksamaan dalam integral,

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz \right| = \left| \int_0^\pi \frac{e^{iR \cos(k)} i e^{ik} \cdot Re^{-R \sin(k)}}{R^2 e^{2ik} + 1} dk \right| \leq \int_0^\pi \left| \frac{e^{iR \cos(k)} i e^{ik} Re^{-R \sin(k)}}{R^2 e^{2ik} + 1} \right| dk.$$

Menggunakan fakta $|e^{ip}| = 1$ untuk setiap $p \in \mathbb{R}$ dan $|ab| = |a||b|$ untuk setiap $a, b \in \mathbb{C}$, diperoleh

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz \right| &\leq \int_0^\pi \left| \frac{e^{iR \cos(k)} i e^{ik} Re^{-R \sin(k)}}{R^2 e^{2ik} + 1} \right| dk \\ &= \int_0^\pi \frac{|e^{iR \cos(k)}| |i| |e^{ik}| |R| |e^{-R \sin(k)}|}{|R^2 e^{2ik} + 1|} dk \\ &= \int_0^\pi \frac{Re^{-R \sin(k)}}{|R^2 e^{2ik} + 1|} dk. \end{aligned}$$

Berdasarkan ketaksamaan segitiga $|a + b| \geq ||a| - |b||$,

$$|R^2 e^{2ik} + 1| \geq \left| |R^2 e^{2ik}| - |1| \right| = \left| |R^2| |e^{2ik}| - 1 \right| = |R^2 - 1| = R^2 - 1.$$

Diperoleh

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{Re^{-R \sin(k)}}{|R^2 e^{2ik} + 1|} dk \leq \int_0^\pi \frac{Re^{-R \sin(k)}}{R^2 - 1} dk.$$

Perhatikan bahwa untuk $0 \leq k \leq \pi$ berlaku $0 \leq \sin(k) \leq 1$. Ini berakibat

$$\frac{Re^{-R}}{R^2 - 1} \leq \frac{Re^{-R \sin(k)}}{R^2 - 1} \leq \frac{R}{R^2 - 1}.$$

Karena $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{Re^{-R}}{R^2 - 1} = 0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R}{R^2 - 1}$, menurut Teorema Apit berlaku $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{Re^{-R \sin(k)}}{R^2 - 1} = 0$.
Jadi, untuk $R \rightarrow \infty$ berlaku

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz \right| \leq \int_0^\pi \frac{Re^{-R \sin(k)}}{R^2 - 1} dk \rightarrow 0 \implies \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz \rightarrow 0.$$

Hal ini memberikan

$$\frac{\pi}{e} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz$$

Jadi,

$$\frac{\pi}{e} = PV \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z^2 + 1} dz = PV \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(z)}{z^2 + 1} dz + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(z)}{z^2 + 1} dz \right].$$

Dengan meninjau komponen real pada kedua ruas,

$$\frac{\pi}{e} = PV \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(z)}{z^2 + 1} dz = PV \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(t)}{t^2 + 1} dt.$$

Berdasarkan Cauchy Principal Value Theorem, dapat disimpulkan $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(t)}{t^2 + 1} dt = \frac{\pi}{e}$ seperti yang ingin dibuktikan.