



Departemen Matematika

Ujian Tengah Semester

Kalkulus I

WILDAN BAGUS WICAKSONO

Matematika 2022

wildan-wicaksono.github.io

2023

Soal

1 Diberikan fungsi $f(x) = \frac{x^2 - 2}{1 - x^2}$.

- (a) Tentukan selang di mana $f(x)$ monoton naik dan di mana $f(x)$ monoton turun.
- (b) Tentukan selang di mana $f(x)$ cekung ke atas dan di mana $f(x)$ cekung ke bawah.
- (c) Bila ada, tentukan semua titik ekstrim dan titik beloknya.
- (d) Bila ada, tentukan semua asimtot yang ada dan berilah penjelasannya.
- (e) Sketsalah grafik $y = f(x)$.

2 Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan $x|x| \leq |x - 2|$.

3 Tentukan konstanta a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 1 \\ ax + b, & 1 \leq x < 2 \\ 3x, & x \geq 2 \end{cases}$$

kontinu di setiap $x \in \mathbb{R}$.

4 Gunakan turunan implisit untuk membuktikan bahwa persamaan garis singgung pada kurva $y^2 = kx$ di (x_0, y_0) adalah $y_0y = \frac{k}{2}(x + x_0)$.

Diberikan fungsi $f(x) = \frac{x^2 - 2}{1 - x^2}$.

- Tentukan selang di mana $f(x)$ monoton naik dan di mana $f(x)$ monoton turun.
- Tentukan selang di mana $f(x)$ cekung ke atas dan di mana $f(x)$ cekung ke bawah.
- Bila ada, tentukan semua titik ekstrim dan titik beloknya.
- Bila ada, tentukan semua asimtot yang ada dan berilah penjelasannya.
- Sketsalah grafik $y = f(x)$.

Solusi:

- (a) Untuk mengecek kemonotonan, perlu dicek $f'(x)$, yaitu

$$f'(x) = \frac{(2x - 0)(1 - x^2) - (x^2 - 2)(0 - 2x)}{(1 - x^2)^2} = \frac{2x - 2x^3 + 2x^3 - 4x}{(1 - x^2)^2} = -\frac{2x}{(1 - x^2)^2}.$$

Perhatikan bahwa $f(x)$ monoton naik apabila $f'(x) > 0$, jadi $-\frac{2x}{(1 - x^2)^2} > 0$. Karena

$(1 - x^2)^2 \geq 0$ untuk sebarang $x \in \mathbb{R}$, dalam hal ini tinggal mempertimbangkan $-2x > 0 \iff x < 0$. Jadi, $f(x)$ monoton naik di interval $(-\infty, 0)$.

Perhatikan bahwa $f(x)$ monoton turun apabila $f'(x) < 0$, jadi $-\frac{2x}{(1 - x^2)^2} < 0$. Karena

$(1 - x^2)^2 \geq 0$ untuk sebarang $x \in \mathbb{R}$, dalam hal ini tinggal mempertimbangkan $-2x < 0 \iff x > 0$. Jadi, $f(x)$ monoton turun di interval $(0, \infty)$.

Jadi, $f(x)$ merupakan monoton naik di $(-\infty, 0)$ dan monoton turun di $(0, \infty)$.

- (b) Untuk menentukan kecekungan, perlu dicek $f''(x)$. Perhatikan bahwa $f'(x) = -\frac{2x}{1 - 2x^2 + x^4}$, maka

$$f''(x) = -\frac{2(1 - 2x^2 + x^4) - 2x(0 - 4x + 4x^3)}{(1 - 2x^2 + x^4)^2} = -\frac{2(1 - x^2)^2 + 8x^2(1 - x^2)}{(1 - x^2)^4}$$

yang dapat difaktorkan menjadi

$$f''(x) = -\frac{2(1-x^2)((1-x^2)+4x^2)}{(1-x^2)^2} = -\frac{2(3x^2+1)}{(1-x^2)^3} = -\frac{6x^2+2}{(1-x^2)^3}.$$

Perhatikan bahwa $x^2 \geq 0$, maka $6x^2+2 \geq 0+2=2$ yang menunjukkan bahwa $6x^2+2 > 0$. Perhatikan bahwa $f(x)$ cekung ke atas apabila $f''(x) > 0$, ini berarti $-\frac{6x^2+2}{(1-x^2)^3} > 0$. Karena $6x^2+2 > 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, maka cukup dipertimbangkan

$$-\frac{1}{(1-x^2)^3} > 0 \iff \frac{1}{(1-x^2)^3} < 0.$$

Akan ditentukan titik pemecahnya, yaitu saat $(1-x^2)^3 = 0 \iff x = 1 \vee x = -1$. Untuk $x < -1$, cek untuk $x = -2$ diperoleh

$$\frac{1}{(1-x^2)^3} = \frac{1}{(1-(-2)^2)^3} = \frac{1}{(1-4)^3} = \frac{1}{(-3)^3} = -\frac{1}{27} < 0.$$

Untuk $-1 < x < 1$, cek untuk $x = 0$ diperoleh

$$\frac{1}{(1-x^2)^3} = \frac{1}{(1-0)^3} = \frac{1}{1} = 1 > 0.$$

Untuk $x > 1$, cek untuk $x = 2$ diperoleh

$$\frac{1}{(1-x^2)^3} = \frac{1}{(1-2^2)^3} = \frac{1}{(1-4)^3} = \frac{1}{(-3)^3} = -\frac{1}{27} < 0.$$

Dari sini diperoleh garis bilangan sebagai berikut. Jadi, penyelesaiannya adalah $x < -1 \vee x > 1$ yang berarti $f(x)$ cekung ke atas di interval $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$.



Kemudian, untuk $f(x)$ cekung ke bawah apabila $f''(x) < 0$, ini berarti $-\frac{6x^2+2}{(1-x^2)^3} < 0$.

Karena $6x^2+2 > 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, hal ini cukup mempertimbangkan

$$-\frac{1}{(1-x^2)^3} < 0 \iff \frac{1}{(1-x^2)^3} > 0.$$

Sebagaimana sebelumnya, diperoleh penyelesaiannya $-1 < x < 1$. Jadi, $f(x)$ cekung ke bawah di interval $(-1, 1)$.

Jadi, $f(x)$ cekung ke atas di $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ dan cekung ke bawah di $(-1, 1)$.

- (c) Titik ekstrim ada tiga kemungkinan: penyelesaian saat $f'(x) = 0$, nilai x yang menyebabkan $f'(x)$ tidak ada, dan ujung interval. Dalam soal ini ujung interval tidak perlu dipertimbangkan.

- Untuk $f'(x) = 0$, maka $-\frac{2x}{(1-x^2)^2} = 0$ sehingga diperoleh $x = 0$.
- Untuk $f'(x)$ tidak ada saat $x = 1$ dan $x = -1$. Namun, $x = 1$ dan $x = -1$ menyebabkan $f(x)$ tidak terdefinisi sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Jadi, titik ekstrimnya adalah $(0, f(0)) = \boxed{(0, -2)}$.

Untuk menentukan titik belok, perlu dipertimbangkan $f''(x) = 0$, dengan kata lain $-\frac{6x^2 + 2}{(1-x^2)^3} = 0 \iff 6x^2 + 2 = 0$ yang tidak memberikan penyelesaian bilangan real karena $x = \pm\sqrt{-\frac{1}{3}} \notin \mathbb{R}$. Jadi, $f(x)$ tidak memiliki titik belok.

(d) Akan ditentukan asimtot datar dari $y = f(x)$, tinjau

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{x^2}}{\frac{1}{x^2} - 1} = \frac{1 - 0}{0 - 1} = -1.$$

Dengan cara yang sama, diperoleh

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{2}{x^2}}{\frac{1}{x^2} - 1} = \frac{1 - 0}{0 - 1} = -1.$$

Jadi, asimtot datar dari $y = f(x)$ adalah $y = -1$.

Akan ditentukan asimtot tegak dari $y = f(x)$, tinjau bahwa

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2}{1 - x^2} = -\infty.$$

Jadi, asimtot tegak dari $y = f(x)$ adalah $x = 1$ dan $x = -1$.

Akan ditentukan asimtot miring dari $y = f(x)$, misalkan $y = mx + n$ di mana $m \neq 0$. Hal ini dapat ditentukan dengan

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = m \neq 0 \quad \text{dan} \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$$


apabila **limitnya ada**.

Tinjau

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2-2}{1-x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2}{x-x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{2}{x^3}}{\frac{1}{x^2} - 1} = \frac{0-0}{0-1} = 0.$$

Mengingat $m \neq 0$, jadi dapat disimpulkan bahwa $y = f(x)$ tidak memiliki asimtot miring.

(e) Memanfaatkan bagian (a), (b), (c), dan (d) diperoleh sketsa dari $y = f(x)$ sebagai berikut.



Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan $x|x| \leq |x - 2|$.

Solusi:

Berdasarkan definisi nilai mutlak,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}, \quad |x - 2| = \begin{cases} x - 2, & x - 2 \geq 0 \\ -(x - 2), & x - 2 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x - 2, & x \geq 2 \\ -x + 2, & x < 2 \end{cases}$$

Akan dibagi kasus berdasarkan nilai x , yaitu saat $x < 0$, $0 \leq x < 2$, dan $x \geq 2$.

- **Kasus 1.** Jika $x < 0$, maka $|x| = -x$ dan $|x - 2| = -x + 2$. Dari sini diperoleh

$$x|x| \leq |x - 2| \implies x(-x) \leq -x + 2 \implies -x^2 \leq -x + 2 \implies 0 \leq x^2 - x + 2.$$

Perhatikan bahwa

$$x^2 - x + 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}.$$

Karena $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$, ini artinya $x^2 - x + 2 \geq 0 + \frac{7}{4} = \frac{7}{4}$. Hal ini menunjukkan bahwa $x^2 - x + 2 \geq 0$ selalu terpenuhi apabila $x < 0$.

- **Kasus 2.** Jika $0 \leq x < 2$, maka $|x| = x$ dan $|x - 2| = -x + 2$. Dari sini diperoleh

$$x|x| \leq |x - 2| \implies x(x) \leq -x + 2 \implies x^2 + x - 2 \leq 0.$$

Akan ditentukan titik pemecahnya, yaitu saat $0 = x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$. Diperoleh bahwa titik pemecahnya $x = -2$ dan $x = 1$.

Untuk interval $(-\infty, -2)$, uji $x = -5$ diperoleh $(-5)^2 + (-5) - 2 = 25 - 5 - 2 = 18 > 0$. Untuk interval $(-2, 1)$, uji $x = 0$ diperoleh $0^2 + 0 - 2 = -2 < 0$. Untuk interval $(1, \infty)$, uji $x = 2$ diperoleh $2^2 + 2 - 2 = 4 + 2 - 2 = 4 > 0$. Diperoleh garis bilangan pertidaksamaan sebagai berikut. Diperoleh bahwa penyelesaian dari $x^2 + x - 2 \leq 0$ adalah $-2 \leq x \leq 1$.



Karena dua syarat $0 \leq x < 2$ dan $-2 \leq x \leq 1$ harus terpenuhi keduanya, maka diiriskan, lalu diperoleh solusinya adalah $0 \leq x \leq 1$.

- **Kasus 3.** Jika $x \geq 2$, maka $|x| = x$ dan $|x - 2| = x - 2$. Dari sini diperoleh

$$x|x| \leq |x - 2| \implies x(x) \leq x - 2 \implies x^2 - x + 2 \leq 0.$$

Dari kasus 1 telah dibuktikan bahwa $x^2 - x + 2 \geq \frac{7}{4}$. Oleh karena itu, $x^2 - x + 2 \leq 0$ tidak memiliki penyelesaian.

Jadi, penyelesaiannya adalah gabungan dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, yaitu $(-\infty, 0) \cup [0, 1] = (-\infty, 1]$. Dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah $\boxed{\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}}$.

Tentukan konstanta a dan b agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 1 \\ ax + b, & 1 \leq x < 2 \\ 3x, & x \geq 2 \end{cases}$$

kontinu di setiap $x \in \mathbb{R}$.

Solusi:

Agar $f(x)$ kontinu di setiap $x \in \mathbb{R}$, perlu dicek kekontinuan di $x = 1$ dan $x = 2$.

- Akan dicek kekontinuan di $x = 1$. Agar $f(x)$ kontinu di $x = 1$, maka haruslah

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1).$$

Tinjau $f(1) = a(1) + b = a + b$, serta

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 1 + 1 = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + b) = a(1) + b = a + b.$$

Ini berarti $2 = a + b = a + b \implies a + b = 2$.

- Akan dicek kekontinuan di $x = 2$. Agar $f(x)$ kontinu di $x = 2$, maka haruslah

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2).$$

Tinjau $f(2) = 3(2) = 6$, serta

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = a(2) + b = 2a + b, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 3x = 3(2) = 6.$$

Ini berarti $2a + b = 6 = 6 \implies 2a + b = 6$.

Jadi, nilai a dan b yang memenuhi haruslah memenuhi sistem persamaan $a + b = 2$ dan $2a + b = 6$, diperoleh $(a, b) = (4, -2)$.

Gunakan turunan implisit untuk membuktikan bahwa persamaan garis singgung pada kurva $y^2 = kx$ di (x_0, y_0) adalah $yy_0 = \frac{k}{2}(x + x_0)$.

Solusi:

Akan ditentukan $\frac{dy}{dx}$, yaitu

$$\frac{d}{dx} y^2 = \frac{d}{dx} kx \implies 2y \frac{dy}{dx} = k \implies \frac{dy}{dx} = \frac{k}{2y}.$$

Diperoleh bahwa kemiringan (gradien) garis singgung di titik (x_0, y_0) adalah $m = \frac{k}{2y_0}$. Karena garis singgung tersebut melalui titik (x_0, y_0) , maka persamaan garis singgung tersebut di titik (x_0, y_0) adalah

$$y - y_0 = m(x - x_0) = \frac{k}{2y_0}(x - x_0) \implies yy_0 - y_0^2 = \frac{k}{2}(x - x_0) \implies yy_0 = y_0^2 + \frac{k}{2}(x - x_0).$$

Karena titik (x_0, y_0) terletak pada grafik $y^2 = kx$, ini berarti $y_0^2 = kx_0$. Substitusikan,

$$yy_0 = kx_0 + \frac{k}{2}(x - x_0) = \frac{k}{2}(2x_0 + x - x_0) = \frac{k}{2}(x + x_0) \implies yy_0 = \frac{k}{2}(x + x_0)$$

seperti yang ingin dibuktikan.